

# 流行性感胃疫苗接種須知

**流**行性感胃是由「流行性感胃病毒」引起的呼吸道感染。發病初期之全身性症狀嚴重，足以影響工作能力，嚴重之併發症亦可導致死亡，根據估計，每5,000~10,000患者，就會有1人死亡。

廣義而言，流行性感胃亦為感冒的一種。一般會引起感冒的病毒至少有百種以上，而引起流行性感胃的流行性感胃病毒則只是其中的一種。因流行性感胃病毒容易引起變異，使得某一族群的人在短時間內都可能感染，所以在流行時10%~50%的人都會得病，故醫學界才特別給予「流行性感胃」的名稱。

## ●疫苗成分及特性

流行性感胃（流感）疫苗為一種不活化的疫苗，由於流感病毒時常發生變異，世界衛生組織每年均會根據全球流行情況，推測可能流行的病毒株，建議疫苗的成分。近年來，流感疫苗均包含有二種A型及一種B型病毒株。

## ●安全性及副作用

流感疫苗是一種相當安全的不活化疫苗。接種後少部分的人可能發生注射部位疼痛、紅腫，發燒、倦怠的輕微反應，但一般均於接種後一、二天內恢復，嚴重的副作用則極少發生。

## ●保護效果

疫苗的保護效果需視當年使用的疫苗株與實際流行的病毒株型別是否相符，否則疫苗之保護力會隨病毒型別的差異加大而降低。根據國外文獻，流感疫苗之保護力因不同族群而異，平均約可達30~80%，對於健康的成年人，約有70~90%的保護力，對老年人，可減少50~60%的人因流感併發症等之住院，並可減少80%之死亡率。

## ●施打對象

今年施打對象增加滿6個月以上至二歲

以下（民國九十一年九月一日至九十三年四月三十日出生）之幼兒，加上六十五歲（民國二十八年十二月三十一日前（含））以上，具中華民國國民身分之老人、醫療機構之醫護等工作人員及衛生所等單位之防疫相關人員等。

## ●接種禁忌

- ◎已知對蛋之蛋白質（Egg-protein）或疫苗其他成份過敏者，不予接種。
- ◎年齡六個月以下者，不予接種。
- ◎其他經醫師評估不適合接種者，不予接種。
- ◎過去注射曾經發生不良反應者。
- ◎發燒或急性疾病，宜予延後接種。
- ◎懷孕者是否接種由醫師評估。

## ●接種時間

- ◎醫護防疫人員：九十三年九月十五日起
- ◎幼兒：九十三年九月二十二日起
- ◎六十五歲以上民眾：九十三年十月五日起

## ●接種後注意事項

- ◎接種後如有持續發燒、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速等及其他不適症狀，應儘速就醫，並以電話通報當地衛生局或疾病管制局。
- ◎完成疫苗接種後，雖可降低感染流感的機率，但仍有可能罹患流感，民眾還需注重保健，維護身體健康。
- ◎接種流感疫苗後48小時內約有1~2%可能有發燒反應，應提供醫師以為診斷之參考，接種48小時以後的發燒症狀，應提醒醫師，可能另有感染或其他發燒原因，但也不能因此排除感染流感的可能。

## ●何處可接種

本縣各鄉鎮市區衛生所及各合約醫療院所。  
洽詢電話：04-7116948或上彰化縣衛生局網站：<http://www.chshb.gov.tw>查詢